


























































內科常見用藥及副作用

內科常見用藥可分為下列五種類：












高血壓、降血糖、抗凝劑（通脈路）、降血脂、腸胃藥。

高血壓常見用藥

分類	藥物名稱		注意事項
A	血管收縮素轉化酶抑制劑(ACEi)		1.發癢、臉部或手的腫脹、乾咳、頭痛、低血壓、暈眩。 2.可能造成鉀離子升高(造成味覺改變，出現金屬味或酸味)對含鉀食物需特別小心。
	Zestril	捷賜瑞錠  	
	Tritace	心達舒錠  	
	Sintec	樂壓錠  	
	血管收縮素受體阻斷劑(ARB)		
	Blopress	博脈舒錠  	1.噁心、疲憊、頭痛頭暈、背痛、肌肉痛。 2.可能造成鉀離子升高(造成味覺改變，出現金屬味或酸味)對含鉀食物需特別小心。 3.與ACEI不同，不會有乾咳的副作用。
	Aprovel	安普諾維錠  	
	Cozaar	可悅您  	
	Micardis	必康平錠  	
	Diovan	得安穩膜衣錠  	
B	Tenormin	天諾敏錠  	1.心跳變慢、四肢冰冷、眩暈頭痛、疲倦。 2.氣喘或糖尿病患服用此類藥品，請告知醫生。
	Concor 5	康肯  	
	Betaloc	舒壓寧控釋錠  	
	Cardolol	心康樂錠  	
	Longcardin	慢又低膜衣錠  	1.眩暈頭痛、虛弱、姿勢性低血壓。 2.氣喘或糖尿病患服用此類藥品，請告知醫生。
	Syntrend	心全定  	
C	Dihydropyridine		1.頭痛、潮紅、水腫、暈眩、疲倦。 2.不可與葡萄柚(汁)併服。 3.冠達悅歐樂:藥錠排出為正常現象。
	Norvasc	脈優錠  	
	Plendil	普心寧持續性釋放錠  	
	Zanidip	利壓膜衣錠  	
	Adalat	冠達悅軟膠囊  	
	Lasyn	樂壓錠膜衣錠  	
	Non-Dihydropyridine		1.心跳徐緩水腫、噁心頭痛、皮膚紅疹 2.便秘、厭食、噁心嘔吐或頭痛、眩暈
	Herbesser	合必爽錠  	
	Cardizem	凱帝心徐放錠  	
	Isoptin	伊抒婷膜衣錠  	
Isoptin	心舒平持續性膜衣錠  		

D	Rosis	樂泄錠		1.頻尿、口乾、心跳不規則、噁心嘔吐。 2.除非醫生指示，否則避免在晚上六點後服用 3.蘇拉通-保鉀利尿劑：造成鉀離子升高(造成味覺改變，出現金屬味或酸味)對含鉀食物需特別小心 4.服爾伊得安錠：痛風患者審慎使用。
	Spirotone	蘇拉通錠		
	Dichlotride	氫氯塞治錠		
	Natrilix	鈉催離		
複方	Hyzaar	好悅您膜衣錠		1.噁心疲憊、頭痛頭暈、背痛肌肉痛 2.可能造成鉀離子升高。 3.頻尿口乾、心跳不規則、噁心嘔吐
	CO-Diovan	可得安穩		
	Co-aprovel	可普諾維膜衣錠		
	Amtrel	諾壓錠		
其他	Doxaben XL	可迅持續性藥效錠		1.姿勢性低血壓、眩暈、頭痛、虛弱。 2.服用時可能會產生暈眩或嗜睡，建議能臥床至少一小時或於睡前服用 3.可迅：藥錠若排出體外為正常現象。
	Hytrin	定脈平錠		
	Stable	血得平錠		

降血糖常見用藥

藥物名稱		注意事項	
Gliben	固利康錠		作用： 刺激胰島素分泌、促進胰島素利用建議飯前服用 長期使用效果變差、低血糖、會引起高胰島素血症、體重增加。
Minidiab	減糖尿		
Diamin	代蜜		
Grumed	達糖定		
Novonorm	諾和隆錠		作用： 促胰島素分泌、隨餐服用、沒吃飯就不吃藥
Glucophage	庫魯化		不會引起低血糖、高胰島素血症、適合肥胖者、需做顯影劑檢查時，務必事先告訴醫師。
Glibudon	泌樂寬		
Glucobay	糖祿錠		引起胃腸不適、腹痛、脹氣、腹瀉。可能使肝臟酵素升高，須監測。不會發生低血糖，但若發生低血糖，須立刻補充葡萄糖，不可使用蔗糖或米飯。
Actos	愛妥糖錠		作用： 可增加周邊組織(如肝臟、肌肉及脂肪組織)對胰島素利用、適用對胰島素有阻抗性者、建議飯後服用
Januvia	佳糖維膜衣錠		飯前或飯後服用均可、不會增加體重、不會發生低血糖。
Onglyza	昂格莎膜衣錠		






抗血小板用藥

藥物名稱		注意事項	
Bokey	伯基		預防或改善血液凝集；用於預防急性心肌梗塞和腦中風。 心臟支架術後。
Plavix	保栓通		
Licodin	利血達		
		可能產生胃部不適、皮膚出疹、頭暈、腹瀉、心跳過快副作用。眩暈、紅疹耳鳴、聽力喪失、血便或黑便、吐血、皮膚出現紫斑、呼吸困難、抽筋等。須停藥並立刻告知醫生。	
		可能產生頭痛、頭昏、眩暈、腹瀉噁心、胃部不適、皮膚紅疹、搔癢等副作用。黑便、血便、吐血、不正常出血、流鼻血、嘔吐、呼吸困難等。	
		顆粒球減少症，再生不良性貧血，血小板減少症，腦出血，消化道出血。	

降血脂用藥

藥物名稱			注意事項
Lipitor	立普妥		患有肝臟方面疾病；或正服用其他藥品，務必告知醫師。 懷孕、正在哺乳，禁服用此類藥品。 服用立普妥或素果期間，禁喝葡萄柚汁。
Lescol XL	益脂可		
Mevalotin	美百樂鎮		
Zocor	素果		
Crestor	冠脂妥		
Lopid	洛脂		有肝臟疾病、腎臟疾病或膽囊疾病；或正在服用其他的藥品；或已經懷孕、正在哺乳，請務必告知醫師。 洛脂膠囊建議飯前30分鐘服用，較有效。 脹氣、胃痛或痙攣、便秘或腹瀉、胃灼熱、頭痛、視力模糊、頭暈及疹或癢、胃腸不適
Fenolip	祛脂		

腸胃藥

藥物名稱			注意事項
Pantoloc	保衛康治潰樂錠		胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群，合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌(Helicobacter Pylori)相關的消化性潰瘍。 作用： 抑制胃酸分泌，治療十二指腸潰瘍、胃潰瘍、胃酸逆流產生的食道炎等。 副作用： 噁心、嘔吐、脹氣、腹瀉、便秘、頭痛、上腹部疼痛、眩暈、視覺模糊。
Rich	胃全膠囊		
Takepron	泰克胃通		
Ulsafe	潰特得		
Defence	祛潰		

臺北榮民總醫院桃園分院-整合照護委員會謹製